

芝草類種子の特性

■特性一覧表

◎最適又は強 ○適又はやや強 △やや適する又はやや弱 ×不適又は弱

種類	品 種	生育特性		草丈 (cm)	環 境 適 応 性					標 準 種 子 性 状					播種適期 (月)		種 類 / 品 種					
		区分	形 態		耐暑	耐寒	耐旱	耐湿	耐塩	耐陰	踏圧	低刈	芝生	粒数/g	純潔度(%) [※]	発芽率(%)		播種量(g/m ²)	発芽適温(℃)			
寒 地 型	トールフェスク		多年 分けつ	60~100	○	◎	◎	△	○	△	○	△	×	400	95	80	15~20	20~30	3~6	8~11	トールフェスク	
		ファイアークラッカーLS	多年 分けつ/地下茎	30~50	○	◎	◎	△	○	○	◎	◎	◎	◎	450	95	80	15~20	20~30	3~6	8~11	ファイアークラッカーLS
		アベンジャー	多年 分けつ	30~50	○	◎	◎	△	○	○	◎	◎	◎	◎	450	95	80	15~20	20~30	3~6	8~11	アベンジャー
	クリーピングレッドフェスク		多年 ほふく茎	40~60	△	◎	○	△	△	◎	○	△	△	1,000	95	80	10~15	20~30	3~6	8~11	クリーピングレッドフェスク	
		カージナル	多年 ほふく茎	30~50	○	◎	○	△	△	◎	◎	◎	◎	1,000	95	80	10~15	20~30	3~6	8~11	カージナル	
	チューイングフェスク		多年 分けつ	30~40	○	◎	○	△	△	◎	○	○	○	1,000	95	80	10~15	20~30	3~6	8~11	チューイングフェスク	
		ゾディアック	多年 分けつ	30~40	○	◎	○	△	△	◎	◎	◎	◎	1,000	95	80	10~15	20~30	3~6	8~11	ゾディアック	
	ペレニアルライグラス		多年 分けつ	50~80	△	△	△	△	○	△	○	△	○	500	98	90	15~20	20~30	3~6	8~11	ペレニアルライグラス	
		ホームラン	多年 分けつ	30~50	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	500	98	90	15~20	20~30	3~6	8~11	ホームラン	
		コンフェティ	多年 分けつ	30~50	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	500	98	90	15~20	20~30	3~6	8~11	コンフェティ	
	イタリアンライグラス		1年 分けつ	60~100	×	○	△	○	○	×	○	△	×	500	98	90	15~20	20~30	3~6	8~11	イタリアンライグラス	
	ケンタッキーブルーグラス		多年 地下茎	30~40	△	○	○	△	×	×	○	○	△	4,000	85	75	10~15	15~30	3~6	8~11	ケンタッキーブルーグラス	
		ミッドナイト	多年 地下茎	20~30	○	◎	◎	△	×	○	◎	◎	◎	2,500	85	75	10~15	15~30	3~6	8~11	ミッドナイト	
		ミッドナイトII	多年 地下茎	20~30	○	◎	◎	△	×	○	◎	◎	◎	2,500	85	75	10~15	15~30	3~6	8~11	ミッドナイトII	
		ラブソディ	多年 地下茎	20~30	○	◎	◎	△	×	○	◎	◎	◎	2,500	85	75	10~15	15~30	3~6	8~11	ラブソディ	
		バリスター	多年 地下茎	20~30	○	◎	◎	△	×	○	◎	◎	◎	3,000	85	75	10~15	15~30	3~6	8~11	バリスター	
	クリーピングベントグラス	A-4(イエロージャケットコート)	多年 ほふく茎	20~40	○	◎	×	△	○	○	◎	◎	◎	7,000	98	80	15~20	15~30	3~5	9~11	A-4(イエロージャケットコート)	
		シャーク	多年 ほふく茎	20~40	○	◎	×	△	○	○	◎	◎	◎	13,000	98	80	6~10	15~30	3~5	9~11	シャーク	
		シャーク(イエロージャケットコート)	多年 ほふく茎	20~40	○	◎	×	△	○	○	◎	◎	◎	7,000	98	80	15~20	15~30	3~5	9~11	シャーク(イエロージャケットコート)	
		ベンクロス	多年 ほふく茎	20~40	○	◎	×	△	○	○	◎	◎	◎	13,000	98	80	6~10	15~30	3~5	9~11	ベンクロス	
ベンクロス(イエロージャケットコート)		多年 ほふく茎	20~40	○	◎	×	△	○	○	◎	◎	◎	7,000	98	80	15~20	15~30	3~5	9~11	ベンクロス(イエロージャケットコート)		
コロニアルベントグラス	ハイランド	多年 分けつ	30~50	○	◎	△	×	×	○	○	○	12,000	98	80	6~10	15~30	3~5	9~11	ハイランド			
レッドトップ		多年 地下茎	40~60	○	◎	△	◎	×	○	×	×	×	12,000	98	80	6~10	15~30	3~5	9~11	レッドトップ		
オーチャードグラス		多年 分けつ	80~120	△	○	○	△	×	◎	○	×	×	1,300	85	80	10~15	20~30	3~6	8~11	オーチャードグラス		
チモシー		多年 分けつ	100~150	×	◎	△	○	×	△	△	×	×	2,500	97	80	6~10	20~30	3~6	9~11	チモシー		
リードカナリーグラス		多年 分けつ	100~200	△	○	○	◎	×	△	△	×	×	1,200	96	75	8~10	20~30	3~6	8~10	リードカナリーグラス		
暖 地 型	バヒアグラス	多年 ほふく茎	40~60	◎	×	◎	○	×	×	○	×	×	300	98	60	15~20	20~35	4~7	—	バヒアグラス		
	センチピードグラス	多年 ほふく茎	10~20	◎	○	○	×	○	○	◎	◎	◎	1,300	98	70	15~20	20~30	4~7	—	センチピードグラス		
	バミューダグラス		多年 ほふく茎	20~40	◎	×	◎	○	◎	×	◎	◎	○	4,000	98	80	8~10	20~35	4~7	—	バミューダグラス	
		プリンセス77(コーティング)	多年 ほふく茎	10~15	◎	△	◎	○	◎	×	◎	◎	◎	1,800	98	80	15~20	20~35	4~7	—	プリンセス77(コーティング)	
		トランスコンチネンタル	多年 ほふく茎	10~15	◎	△	◎	○	◎	×	◎	◎	◎	3,800	98	80	8~10	20~35	4~7	—	トランスコンチネンタル	
	ノシバ(発芽促進処理済)	多年 ほふく茎	15~30	◎	○	◎	×	◎	○	◎	◎	◎	1,500	98	70	15~20	20~35	4~7	—	ノシバ		
	ノシバ(発芽率90%調整種子)	多年 ほふく茎	15~30	◎	○	◎	×	◎	○	◎	◎	◎	1,500	98	90	15~20	20~35	4~7	—	ノシバ(発芽率90%調整種子)		
マ メ 科 ・ 他	シロクローバ	多年 ほふく茎	20~30	○	○	△	○	×	×	○	△	×	1,500	98	85	8~10	20~30	3~6	9~11	シロクローバ		
	アカクローバ	多年 分けつ	60~80	×	○	△	×	×	×	×	×	×	600	98	85	8~10	20~30	3~6	9~11	アカクローバ		
	バースフットトレフォイル	多年 分けつ	30~50	○	○	△	×	×	×	×	×	×	600	98	80	8~10	20~30	3~6	9~11	バースフットトレフォイル		
	ダイカンドラ	多年 ほふく茎	3~5	○	△	×	◎	×	◎	△	—	○	200	98	80	10~15	20~30	3~6	9~10	ダイカンドラ		

※イエロージャケットコート種子の純潔度はコート材を含む。